

「オートマトンと形式言語」補足資料(1)

1 文字列に関する補足 (教科書 0.2 節)

- ε は空文字列を表わしているから, 任意の文字列 w について, $\varepsilon w = w\varepsilon = w$
- ε は文字列の連結に関する単位元なので, 以下のように定義する: 任意の文字列 w について, $w^0 = \varepsilon$
- 任意の $k \geq 0$ について, $\varepsilon^k = \varepsilon$
- Σ を文字集合とする. このとき, Σ^* は, 以下のように定義される文字列の集合:

$$\Sigma^* = \{x_1 \cdots x_k \mid k \geq 0, \text{任意の } 1 \leq i \leq k \text{ について } x_i \in \Sigma\}$$

- 以下の性質が成り立つことにも注意:
 1. $\varepsilon \in \Sigma^*$
 2. $u \in \Sigma^*$ かつ $w \in \Sigma^*$ ならば, $uw \in \Sigma^*$

2 有限オートマトンの計算に関する補足 (教科書 1.1 節)

定義 1 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ を (決定性) 有限オートマトンとする. このとき, $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ を以下のように再帰的に定義する:

$$\hat{\delta}(q, w) = \begin{cases} q & (w = \varepsilon \text{ の場合}) \\ \hat{\delta}(\delta(x, q), w') & (w = xw', x \in \Sigma \text{ の場合}) \end{cases}$$

遷移関数 δ は, $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$. 一方, 上で定義した関数 $\hat{\delta}$ は, $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ であることに注意.

例 2 例 1.7 の有限オートマトン $M_2 = (\{q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_1, \{q_2\})$ を考える. このとき,

$$\begin{aligned} \hat{\delta}(q_1, 101) &= \hat{\delta}(\delta(q_1, 1), 01) \\ &= \hat{\delta}(q_2, 01) \\ &= \hat{\delta}(\delta(q_2, 0), 1) \\ &= \hat{\delta}(q_1, 1) \\ &= \hat{\delta}(\delta(q_1, 1), \varepsilon) \\ &= \hat{\delta}(q_2, \varepsilon) \\ &= q_2 \end{aligned}$$

上で定義した関数 $\hat{\delta}$ を用いると, 有限オートマトンの受理する言語は, 以下のように定義できる:

定義 3 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ を (決定性) 有限オートマトンとする. このとき, M の認識する (受理する) 言語 $L(M)$ は, 次のように定義される.

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F\}$$

3 演算に関する補足 (p.51)

1. $n \geq 1$ を自然数とし, A を集合とすると, 関数 $f: A^n \rightarrow A$ を A 上の n 項演算という. なお, $n = 1$ のときは, $A^1 = A$ に注意. $n = 1$ のときは単項演算ともいう.
2. f を集合 A 上の n 項演算とし, $B \subseteq A$ とする. 任意の $b_1, \dots, b_n \in B$ について $f(b_1, \dots, b_n) \in B$ となるとき, B は演算 f について閉じている, という.

4 補集合を認識する有限オートマトン (演習 1.5)

以下では, 次の集合演算を用いる.

$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$$

(A が全体集合である場合, $A \setminus B$ は B の補集合を表わす.)

定理 4 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ を (決定性) 有限オートマトンとする. このとき, (決定性) 有限オートマトン M' を以下のように定義する:

$$M' = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F)$$

このとき, $\Sigma^* \setminus L(M) = L(M')$.

証明.

$$\begin{aligned} w \in \Sigma^* \setminus L(M) & \\ \iff w \in \Sigma^* \wedge w \notin L(M) & \quad (\setminus \text{の定義より}) \\ \iff w \in \Sigma^* \wedge w \notin \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F\} & \quad (L(M) \text{の定義より}) \\ \iff w \in \Sigma^* \wedge \neg(w \in \Sigma^* \wedge \hat{\delta}(q_0, w) \in F) & \quad (\text{内包表記の展開}) \\ \iff w \in \Sigma^* \wedge \neg(\hat{\delta}(q_0, w) \in F) & \quad (\text{論理演算による同値変形}) \\ \iff w \in \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \notin F\} & \quad (\text{内包表記への変形}) \\ \iff w \in \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in Q \setminus F\} & \\ \iff w \in L(M') & \end{aligned}$$

□

5 定理 1.25 に関する補足 (教科書 1.1 節) (1)

定理 5 $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ および $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$ を (決定性) 有限オートマトンとする. このとき, (決定性) 有限オートマトン $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ を以下により定義する:

1. $Q = Q_1 \times Q_2$,
2. $\delta((r_1, r_2), x) = (\delta_1(r_1, x), \delta_2(r_2, x))$,
3. $q_0 = (q_1, q_2)$,

$$4. F = (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2) .$$

このとき , $L(M) = L(M_1) \cup L(M_2) .$

証明 . まず ,

性質 (A) : 任意の $w \in \Sigma^*$, $r_1 \in Q_1$, $r_2 \in Q_2$ について ,
 $(\hat{\delta}_1(r_1, w), \hat{\delta}_2(r_2, w)) = \hat{\delta}((r_1, r_2), w)$

を示す .

性質 (A) の証明 . 文字列 w の長さに関する帰納法で示す .

1. $|w| = 0$ の場合 . このとき , $w = \varepsilon .$ よって ,

$$(\hat{\delta}_1(r_1, \varepsilon), \hat{\delta}_2(r_2, \varepsilon)) = (r_1, r_2) = \hat{\delta}((r_1, r_2), \varepsilon)$$

2. $|w| > 0$ の場合 . このとき , $w = xw'$ ($x \in \Sigma$, $w' \in \Sigma^*$) とおける . いま ,
 $\delta_1(r_1, x) = r'_1$, $\delta_2(r_2, x) = r'_2$ とおくと , δ の定義から ,

$$(r'_1, r'_2) = (\delta_1(r_1, x), \delta_2(r_2, x)) = \delta((r_1, r_2), x) \quad (1)$$

が成立する . よって ,

$$\begin{aligned} & (\hat{\delta}_1(r_1, xw'), \hat{\delta}_2(r_2, xw')) \\ &= (\hat{\delta}_1(\delta_1(r_1, x), w'), \hat{\delta}_2(\delta_2(r_2, x), w')) \quad (\hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2 \text{ の定義より}) \\ &= (\hat{\delta}_1(r'_1, w'), \hat{\delta}_2(r'_2, w')) \quad (r'_1, r'_2 \text{ の定義より}) \\ &= \hat{\delta}((r'_1, r'_2), w') \quad (\text{帰納法の仮定より}) \\ &= \hat{\delta}(\delta((r_1, r_2), x), w') \quad (\text{等式 (1) より}) \\ &= \hat{\delta}((r_1, r_2), xw') \quad (\hat{\delta} \text{ の定義より}) \end{aligned}$$

(性質 (A) の証明の終わり)

従って ,

$$\begin{aligned} & w \in L(M_1) \cup L(M_2) \\ \iff & w \in L(M_1) \vee w \in L(M_2) \\ \iff & w \in \Sigma^* \wedge (\hat{\delta}_1(q_1, w) \in F_1 \vee \hat{\delta}_2(q_2, w) \in F_2) \\ \iff & w \in \Sigma^* \wedge (\hat{\delta}_1(q_1, w), \hat{\delta}_2(q_2, w)) \in (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2) \\ \iff & w \in \Sigma^* \wedge (\hat{\delta}_1(q_1, w), \hat{\delta}_2(q_2, w)) \in F \quad (F \text{ の定義より}) \\ \iff & w \in \Sigma^* \wedge \hat{\delta}((q_1, q_2), w) \in F \quad (\text{性質 (A) より}) \\ \iff & w \in \Sigma^* \wedge \hat{\delta}(q_0, w) \in F \quad (q_0 \text{ の定義より}) \\ \iff & w \in \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F\} \\ \iff & w \in L(M) \end{aligned}$$

□

定理 6 $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ および $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$ を (決定性) 有限オートマトンとする . このとき , (決定性) 有限オートマトン $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ を以下により定義する :

1. $Q = Q_1 \times Q_2$,

2. $\delta((r_1, r_2), x) = (\delta_1(r_1, x), \delta_2(r_2, x))$,
3. $q_0 = (q_1, q_2)$,
4. $F = F_1 \times F_2$.

このとき , $L(M) = L(M_1) \cap L(M_2)$.

証明 . まず , 性質 (A) は定理 5 のときと同様に証明できる . これを使って ,

$$\begin{aligned}
& w \in L(M_1) \cap L(M_2) \\
\iff & w \in L(M_1) \wedge w \in L(M_2) \\
\iff & w \in \Sigma^* \wedge (\hat{\delta}_1(q_1, w) \in F_1 \wedge \hat{\delta}_2(q_2, w) \in F_2) \\
\iff & w \in \Sigma^* \wedge (\hat{\delta}_1(q_1, w), \hat{\delta}_2(q_2, w)) \in F_1 \times F_2 \\
\iff & w \in \Sigma^* \wedge (\hat{\delta}_1(q_1, w), \hat{\delta}_2(q_2, w)) \in F \\
\iff & w \in \Sigma^* \wedge \hat{\delta}((q_1, q_2), w) \in F && \text{(性質 (A) より)} \\
\iff & w \in \Sigma^* \wedge \hat{\delta}(q_0, w) \in F && \text{(} q_0 \text{ の定義より)} \\
\iff & w \in \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F\} \\
\iff & w \in L(M)
\end{aligned}$$

□

6 定理 1.25 に関する補足 (教科書 1.1 節) (2)

前節の定理では , M_1 と M_2 として , シグニチャが同一のものを考えた . 異なるシグニチャをもつ場合はどうなるだろうか .

一般に , $M_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_1, F_1)$, $M_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, q_2, F_2)$ とおくとき , まず $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$ ととり , $L(M'_1) = L(M_1)$, $L(M'_2) = L(M_2)$ となるような , $M'_1 = (Q'_1, \Sigma, \delta'_1, q'_1, F'_1)$, $M'_2 = (Q'_2, \Sigma, \delta'_2, q'_2, F'_2)$ を構成した後に , 前節の構成を適用すれば , $L(M_1) \cap L(M_2) = L(M'_1) \cap L(M'_2)$ や $L(M_1) \cup L(M_2) = L(M'_1) \cup L(M'_2)$ を認識する (決定性) 有限オートマトンを構成することができる .

このように , 考えるシグニチャを広げて (最初考えていなかった記号でも動くようにして) , しかも , 認識する言語を変えないようなことはできるのだろうか . それは以下のようにすればよい .

定理 7 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ を (決定性) 有限オートマトンとする . Γ を $\Sigma \subseteq \Gamma$ なるアルファベットとする . このとき , (決定性) 有限オートマトン $M' = (Q', \Gamma, \xi, q_0, F)$ を以下により定義する :

1. $Q' = Q \cup \{q'\}$. ただし , $q' \notin Q$ とする .
- 2.

$$\xi(r, x) = \begin{cases} \delta(r, x) & (r \in Q \text{ かつ } x \in \Sigma \text{ の場合}) \\ q' & (r \notin Q \text{ または } x \notin \Sigma \text{ の場合}) \end{cases}$$

このとき , $L(M) = L(\hat{M})$.

証明．まず，

性質 (B) : 任意の $w \in \Sigma^*$, $r \in Q$ について， $\hat{\delta}(r, w) = \hat{\xi}(r, w)$

を示す．

性質 (B) の証明．文字列 $w \in \Sigma^*$ の長さに関する帰納法で示す．

1. $|w| = 0$ の場合．このとき， $w = \varepsilon$ ．よって，

$$\hat{\delta}(r, \varepsilon) = r = \hat{\xi}(r, \varepsilon)$$

2. $|w| > 0$ の場合．このとき， $w = xw'$ ($x \in \Sigma, w' \in \Sigma^*$) とおける．いま， $\delta(r, x) = r'$ とおくと， $r' \in Q$ であることに注意する．

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(r, xw') &= \hat{\delta}(\delta(r, x), w') \quad (\hat{\delta} \text{ の定義より}) \\ &= \hat{\xi}(\delta(r, x), w') \quad (w' \in \Sigma^* \text{ と } \delta(r, x) \in Q \text{ より，帰納法の仮定から}) \\ &= \hat{\xi}(\xi(r, x), w') \quad (r \in Q, x \in \Sigma \text{ より，} \xi \text{ の定義から}) \\ &= \hat{\xi}(r, xw') \quad (\hat{\xi} \text{ の定義より})\end{aligned}$$

(性質 (B) の証明の終わり)

次に，

性質 (B') : 任意の $w \in \Gamma^*$ について， $\hat{\xi}(q', w) = q'$

を示す．

性質 (B') の証明．文字列 $w \in \Sigma^*$ の長さに関する帰納法で示す．

1. $|w| = 0$ の場合．このとき， $w = \varepsilon$ ．よって，定義より， $\hat{\xi}(q', \varepsilon) = q'$ が成立．
2. $|w| > 0$ の場合．このとき， $w = xw'$ ($x \in \Gamma, w' \in \Gamma^*$) とおける．

$$\begin{aligned}\hat{\xi}(q', xw') &= \hat{\xi}(\xi(q', x), w') \quad (\hat{\xi} \text{ の定義より}) \\ &= \hat{\xi}(q', w') \quad (\xi \text{ の定義より}) \\ &= q' \quad (\text{帰納法の仮定より})\end{aligned}$$

(性質 (B') の証明の終わり)

次に，

性質 (B'') : 任意の $w \in \Gamma^* \setminus \Sigma^*$ と $r \in Q'$ について， $\hat{\xi}(r, w) = q'$

を示す．

性質 (B'') の証明．文字列 $w \in \Sigma^*$ の長さに関する帰納法で示す．

1. $|w| = 0$ の場合．このとき， $w = \varepsilon$ ．よって， $w \notin \Gamma^* \setminus \Sigma^*$ となるので，自明に成立する．
2. $|w| > 0$ の場合．このとき， $w = xw'$ ($x \in \Gamma, w' \in \Gamma^*$) とおける．仮定 $w \notin \Sigma^*$ より， $x \notin \Sigma$ または $w' \notin \Sigma^*$ が成立する．

- $x \notin \Sigma$ の場合

$$\begin{aligned}\hat{\xi}(r, xw') &= \hat{\xi}(\xi(r, x), w') \quad (\hat{\xi} \text{ の定義より}) \\ &= \hat{\xi}(q', w') \quad (x \notin \Sigma \text{ より, } \xi \text{ の定義から}) \\ &= q' \quad (\text{性質 (B')} \text{ より})\end{aligned}$$

- $w' \notin \Sigma^*$ の場合

$$\begin{aligned}\hat{\xi}(r, xw') &= \hat{\xi}(\xi(r, x), w') \quad (\hat{\xi} \text{ の定義より}) \\ &= q' \quad (\text{帰納法の仮定より})\end{aligned}$$

(性質 (B'')) の証明の終わり)

以上の準備を用いて, 定理を示す.

$$\text{任意の } w \in \Gamma^* \text{ について, } w \in L(M) \iff w \in L(M')$$

示せばよい. 2通りに場合分けする.

- $w \in \Sigma^*$ の場合

$$\begin{aligned}w \in L(M) &\iff \hat{\delta}(q_0, w) \in F \\ &\iff \hat{\xi}(q_0, w) \in F \quad (w \in \Sigma^*, q_0 \in Q \text{ より, 性質 (B) から}) \\ &\iff w \in L(M')\end{aligned}$$

- $w \notin \Sigma^*$ の場合

このとき, $L(M) \subseteq \Sigma^*$ より, $w \in L(M)$ は成立しない. よって, $w \notin L(M')$ を示せば十分.

いま, $w \in \Gamma^*$ で $w \notin \Sigma^*$ であるから, $w \in \Gamma^* \setminus \Sigma^*$. したがって, 性質 (B'') より, $\hat{\xi}(q_0, w) = q'$. よって, $q' \notin F$ より, $w \notin L(M')$ となる.

□