

2023年度 数理論理学

講義資料(8)

青戸 等人 (知能情報システムプログラム)

次の規則に従って約束される記号の列が、命題論理の言葉や言明にあたる。これを**命題論理式**とよぶ。

- (規則1.) P を命題変数とするとき、 P は命題論理式である。
- (規則2.) \top および \perp は命題論理式である。
- (規則3.) A が命題論理式であるとき、 $(\neg A)$ は命題論理式である。
- (規則4.) A と B がともに命題論理式であるとき、
 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$
 は、ともに命題論理式である。
- (規則5.) 規則1~4により構成されるものだけが命題論理式である。

3/39

目次

- 帰納的定義
- (構造)帰納法
- 帰納法による証明

帰納的定義

(規則5)の代わりに「**帰納的に定義する**」という言い方が一般的に用いられる。

- 定義 8.1. 命題論理式を次のように帰納的に定義する。
- (規則1.) P を命題変数とするとき、 P は命題論理式である。
 - (規則2.) \top および \perp は命題論理式である。
 - (規則3.) A が命題論理式であるとき、 $(\neg A)$ は命題論理式である。
 - (規則4.) A と B がともに命題論理式であるとき、
 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$
 は、ともに命題論理式である。

なお、講義資料(2)で説明したように、以降、括弧は約束に従って省略する。

4/39

(構造)帰納法

帰納的に定義された対象を示すときによく使われる証明手法の1つとして、**(構造)帰納法**がある。帰納法は、直接/間接的に論理学と関係し、論理学においてもコンピュータサイエンス全般においても非常に重要。

この資料では、特に、**帰納的定義**、そして、**構造帰納法**について、**命題論理式**を題材にして学習する。

例. $((P_0 \rightarrow P_2) \vee (\neg \perp))$ が命題論理式であることを導く。

- (1) (規則1.)から、 P_0, P_2 は命題論理式。
- (2) (規則4.)を使うと、(1)より、 $(P_0 \rightarrow P_2)$ は命題論理式。
- (3) (規則2.)から、 \perp は命題論理式。
- (4) (規則3.)を使うと、(3)より、 $(\neg \perp)$ は命題論理式。
- (5) (規則4.)を使うと、(2)と(4)より、 $((P_0 \rightarrow P_2) \vee (\neg \perp))$ は命題論理式。

1/39

5/39

命題論理の言語

はじめに、「**命題論理式が帰納的に定義されている**」ことについて説明する。

用いられる個々の記号を**言語**とよぶ。命題論理の言語として次の**3種類**の記号を用いる。

- 命題変数: P_0, P_1, P_2, \dots
- 命題結合子: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \top, \perp$
- その他: $(,)$

青字が対象記号、黒字はメタ記号。(開・閉)括弧も言語に含まれることに注意。 P_1 では、 P と $_1$ がそれぞれ独立の記号ではなく、 P_1 で1つの記号と見做していることに注意。通常、命題変数は(可算)無限個あるとする。

2/39

集合を用いた定義

定義 8.2. 集合 C_0, C_1, \dots を以下のように定義する。

$$C_0 = \{P_i \mid i \in \mathbb{N}\} \cup \{\top, \perp\}$$

$$C_{n+1} = C_n \cup \{(\neg A) \mid A \in C_n\} \\ \cup \{(A \wedge B) \mid A, B \in C_n\} \\ \cup \{(A \vee B) \mid A, B \in C_n\} \\ \cup \{(A \rightarrow B) \mid A, B \in C_n\} \\ \cup \{(A \leftrightarrow B) \mid A, B \in C_n\}$$

このとき、以下の集合 C_* を命題論理式集合と定義する。

$$C_* = \bigcup_{i \geq 0} C_i$$

冗長だが、普遍的な数学的記述。

6/39

“帰納的”の意味

命題論理式の定義における“帰納的”の意味は、

(規則5.) 規則1~4により構成されるものだけが命題論理式であった。つまり、余計なものが入っていないということ。

したがって、帰納的に定義された対象は定義の規則の適用を有限回適用されて構成されている。つまり、その対象に至る、規則の有限回の適用ステップ(導出木)がある。

$$\frac{\frac{\frac{P_0 \in \text{Prop}}{\text{規則1}} \quad \frac{P_2 \in \text{Prop}}{\text{規則1}} \quad \frac{\perp \in \text{Prop}}{\text{規則2}}}{(P_0 \rightarrow P_2) \in \text{Prop}} \text{規則4} \quad \frac{\perp \in \text{Prop}}{(\neg \perp) \in \text{Prop}} \text{規則3}}{((P_0 \rightarrow P_2) \vee (\neg \perp)) \in \text{Prop}} \text{規則4}$$

Propは命題論理式集合を表した(⇒第2回講義資料)

7/39

$((P_0 \rightarrow P_2) \vee (\neg \perp))$ の導出木

$$\frac{\frac{\frac{P_0 \in \text{Prop}}{\text{規則1}} \quad \frac{P_2 \in \text{Prop}}{\text{規則1}} \quad \frac{\perp \in \text{Prop}}{\text{規則2}}}{(P_0 \rightarrow P_2) \in \text{Prop}} \text{規則4} \quad \frac{\perp \in \text{Prop}}{(\neg \perp) \in \text{Prop}} \text{規則3}}{((P_0 \rightarrow P_2) \vee (\neg \perp)) \in \text{Prop}} \text{規則4}$$

演習 8.3. 同様に、 $((\neg P_0) \rightarrow \perp)$ の導出木を書いてみよう。

8/39

$((P_0 \rightarrow P_2) \vee (\neg \perp))$ の導出木

$$\frac{\frac{\frac{P_0 \in \text{Prop}}{\text{規則1}} \quad \frac{P_2 \in \text{Prop}}{\text{規則1}} \quad \frac{\perp \in \text{Prop}}{\text{規則2}}}{(P_0 \rightarrow P_2) \in \text{Prop}} \text{規則4} \quad \frac{\perp \in \text{Prop}}{(\neg \perp) \in \text{Prop}} \text{規則3}}{((P_0 \rightarrow P_2) \vee (\neg \perp)) \in \text{Prop}} \text{規則4}$$

演習 8.3. 同様に、 $((\neg P_0) \rightarrow \perp)$ の導出木を書いてみよう。

解答例:

$$\frac{\frac{\frac{P_0 \in \text{Prop}}{\text{規則1}}}{(\neg P_0) \in \text{Prop}} \text{規則3} \quad \frac{\perp \in \text{Prop}}{\text{規則2}}}{((\neg P_0) \rightarrow \perp) \in \text{Prop}} \text{規則4}$$

8/39

BNFを用いた定義

計算機科学の分野では、帰納的定義にBNF (Backus-Naur記法)をよく用いる。

定義 8.4. 命題変数集合Varおよび命題論理式集合Propを以下のように与える:

$$\begin{aligned} P \in \text{Var} &::= P_0 \mid P_1 \mid \dots \\ A, B \in \text{Prop} &::= P \mid \top \mid \perp \mid (\neg A) \mid (A \wedge B) \\ &\quad \mid (A \vee B) \mid (A \rightarrow B) \mid (A \leftrightarrow B) \end{aligned}$$

数学や論理学の分野ではあまり見かけないが、計算機科学の分野では標準的。

9/39

BNFと文脈自由文法

BNFのようなものをどこかで見た記憶がないだろうか?

$$\begin{aligned} P \in \text{Var} &::= P_0 \mid P_1 \mid \dots \\ A, B \in \text{Prop} &::= P \mid \top \mid \perp \mid (\neg A) \mid (A \wedge B) \\ &\quad \mid (A \vee B) \mid (A \rightarrow B) \mid (A \leftrightarrow B) \end{aligned}$$

BNFによる記述は(ほぼ)文脈自由文法に対応する。

$$\begin{aligned} A &\rightarrow P \mid \top \mid \perp \mid (\neg A) \mid (A \wedge A) \\ &\quad \mid (A \vee A) \mid (A \rightarrow A) \mid (A \leftrightarrow A) \\ P &\rightarrow P_0 \mid P_1 \mid \dots \end{aligned}$$

実際、BNFで記述された対象のプログラム処理では、字句解析によって命題変数を抽象化して1つの終端記号をして扱えるようにした後、文脈自由言語の技術を用いた構文解析によって、対象の構造を解析する。

10/39

目次

- 帰納的定義
- (構造)帰納法
- 帰納法による証明

(構造)帰納法

帰納法

帰納的に定義された対象についての性質を示すための証明法

Pを命題論理式に関する性質とする。帰納法は以下を示すことで、すべての命題論理式が性質Pをもつことを導く。

- (1) 任意の命題変数は性質Pをもつ。
- (2) \top および \perp は性質Pをもつ。
- (3) 任意の命題論理式Aについて、Aが性質Pをもつならば、 $\neg A$ も性質Pをもつ。
- (4) 任意の命題論理式A, Bについて、AもBも性質Pをもつならば、 $A \wedge B, A \vee B, A \rightarrow B, A \leftrightarrow B$ も性質Pをもつ。

11/39

帰納法の仮定

帰納法の仮定

より構成ステップ数が少ない対象に関して性質Pが成立する、という仮定を帰納法の仮定とよぶ。

- (3) 任意の命題論理式Aについて、Aが性質Pをもつならば、 $\neg A$ も性質Pをもつ。
- (4) 任意の命題論理式A, Bについて、AもBも性質Pをもつならば、 $A \wedge B, A \vee B, A \rightarrow B, A \leftrightarrow B$ も性質Pをもつ。

基本ステップ(Base Step)と帰納ステップ(Induction Step)

帰納法の仮定を用いる場合分けを帰納ステップ、帰納法の仮定を用いない場合分けを基本ステップとよぶことがある。

12/39

帰納法による推論の妥当性

帰納的に定義された対象は定義の規則の適用を有限回適用されて構成されている。つまり、その対象に至る、規則の有限回の適用ステップがある。

(規則1.)より P_0, P_2 は命題論理式。

従って、(規則4.)より $(P_0 \rightarrow P_2)$ は命題論理式。

(規則2.)より \perp は命題論理式。

従って、(規則3.)より $(\neg\perp)$ は命題論理式。

従って、(規則4.)より $((P_0 \rightarrow P_2) \vee (\neg\perp))$ は命題論理式。

帰納法による証明の(1)~(4)が示されていれば、これらを繰り返し使うことによって、その対象が性質 P を持つことが導かれる。次のページで具体的に見てみよう。

13/39

(規則1.)より P_0, P_2 は命題論理式。

1. 帰納法による証明(1)より、 P_0, P_2 は性質 P をもつ。

従って、(規則4.)より $(P_0 \rightarrow P_2)$ は命題論理式。

2. 従って、帰納法による証明(4)より、 $(P_0 \rightarrow P_2)$ は性質 P をもつ。

(規則2.)より \perp は命題論理式。

3. 帰納法による証明(2)より、 \perp は性質 P をもつ。

従って、(規則3.)より $(\neg\perp)$ は命題論理式。

4. 従って、帰納法による証明(3)より、 $(\neg\perp)$ は性質 P をもつ。

従って、(規則4.)より $((P_0 \rightarrow P_2) \vee (\neg\perp))$ は命題論理式。

5. 従って、帰納法による証明(4)より、 $((P_0 \rightarrow P_2) \vee (\neg\perp))$ は性質 P をもつ。

同様に、どの命題論理式についても、性質 P をもつことが導かれる。

14/39

(構造)帰納法 vs. 数学的帰納法

自然数に関する帰納法を特に**数学的帰納法**という。命題論理式の構造に関する帰納法は、命題論理式のサイズ(出現する記号の数)を考えれば、サイズに関する**数学的帰納法**で示していると考えられる。

逆に、自然数を $0, S(0), \dots$ と考えれば、**数学的帰納法**は**構造帰納法**の一種と考えることも出来る。

15/39

数学的帰納法を使って、(命題論理式の)構造帰納法による推論の妥当性を示してみよう。

命題論理式のうち、性質 P をもつものを D とおく。すると、すべての命題論理式が性質 P をもつことは、 $C_* \subseteq D$ が成立することに等しい。

帰納法による証明(1)~(4)が示していると仮定する。

帰納法による証明(1),(2)により、 $C_0 \subseteq D$ が成立する。帰納法による証明(3),(4)により、 $C_n \subseteq D$ ならば $C_{n+1} \subseteq D$ が成立する。

自然数に関する帰納法により、任意の $i \in \mathbb{N}$ について、 $C_i \subseteq D$ 。よって、和集合の性質から、 $C_* = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} C_i \subseteq D$ 。

□

16/39

目次

- 帰納的定義
- (構造)帰納法
- 帰納法による証明

再帰的な定義

帰納法による証明は再帰的な定義とともに用いられることが多い。対象 A をパラメータとする $f(A)$ を定義する際に、定義のなかに f を用いる場合、その定義を**再帰的**であるという。

例. 自然数 n の階乗 $n!$ を求める関数 f は以下のように与えることが出来る。

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x = 0 \text{ の場合}) \\ x * f(x-1) & (x > 0 \text{ の場合}) \end{cases}$$

$f(3) = 3 * f(2) = 3 * 2 * f(1) = 3 * 2 * 1 * f(0) = 3 * 2 * 1 * 1 = 6$ 再帰的に定義された関数の計算結果を求めるためには、定義を繰り返し展開する必要がある。

17/39

再帰的な定義を用いる場合の注意

再帰的な定義を行う際は、きちんと定義になっているか、注意が必要である。例えば、 f の呼び出しが無限に繰り返してしまうなどすると、定義として成立しない。定義が、定義として成立している(意味のある定義になっている)とき、**well-defined** であるという。

例えば、以下の再帰的な定義を考えてみる。

$$f(x) = (\text{if } x = 0 \text{ then } 1 \text{ else } x * f(x-1))$$

$n \geq 0$ の場合には $f(n) = n!$ となるが、 n が負の数の場合には、 f の呼び出しが無限に繰り返され、定義されない。従って、 f は整数上で **well-defined** でない。

18/39

命題論理式のサイズ

定義 8.5. 命題論理式 A の深さ $d(A)$ を次のように定義する。

$$d(A) = \begin{cases} 0 & (A \text{ が命題変数のとき}) \\ 0 & (A = \top \text{ または } A = \perp \text{ のとき}) \\ d(B) + 1 & (A = \neg B \text{ のとき}) \\ \max\{d(B), d(C)\} + 1 & (A = B \wedge C \text{ または } A = B \vee C, \\ & A = B \rightarrow C, A = B \leftrightarrow C \text{ のとき}) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & d((P \rightarrow (Q \rightarrow (\neg R)))) \\ &= \max\{d(P), d((Q \rightarrow (\neg R)))\} + 1 \\ &= \max\{0, d((Q \rightarrow (\neg R)))\} + 1 \\ &= \max\{0, \max\{d(Q), d((\neg R))\} + 1\} + 1 \\ &= \max\{0, \max\{0, d(R) + 1\} + 1\} + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

19/39

演習 8.6. $d(((\neg P) \wedge (Q \rightarrow R)))$ を計算せよ.

演習 8.6. $d(((\neg P) \wedge (Q \rightarrow R)))$ を計算せよ.

$$\begin{aligned} & d(((\neg P) \wedge (Q \rightarrow R))) \\ &= \max\{d((\neg P)), d((Q \rightarrow R))\} + 1 \\ &= \max\{d(P) + 1, \max\{d(Q), d(R)\} + 1\} + 1 \\ &= \max\{1, \max\{0, 0\} + 1\} + 1 \\ &= \max\{1, 1\} + 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

20/39

21/39

定義 8.7. 命題結合子(命題定数を含む)の個数 $c(A)$ は以下のように定義される.

$$c(A) = \begin{cases} 0 & (A \text{ が命題変数のとき}) \\ 1 & (A = \top \text{ または } A = \perp \text{ のとき}) \\ c(B) + 1 & (A = \neg B \text{ のとき}) \\ c(B) + c(C) + 1 & (A = B \wedge C \text{ または } A = B \vee C, \\ & A = B \rightarrow C, A = B \leftrightarrow C \text{ のとき}) \end{cases}$$

演習 8.8. $c(((\neg P) \wedge (Q \rightarrow R)))$ の値を計算せよ.

$$\begin{aligned} & c(((\neg P) \wedge (Q \rightarrow R))) \\ &= c((\neg P)) + c((Q \rightarrow R)) + 1 \\ &= (c(P) + 1) + (c(Q) + c(R) + 1) + 1 \\ &= (0 + 1) + (0 + 0 + 1) + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

演習 8.9. 任意の命題論理式 A について, $d(A) \leq c(A)$ を示せ.

22/39

23/39

帰納法による証明例 (1)

命題 8.10. 任意の命題論理式 A について, $d(A) \leq c(A)$.

証明. 命題論理式 A に関する帰納法により証明を行う.

1. A が命題変数のとき.

$d(A), c(A)$ の定義より, $d(A) = 0, c(A) = 0$. ゆえに, $d(A) \leq c(A)$.

2. $A = \top$ または $A = \perp$ のとき.

$d(A), c(A)$ の定義より, $d(A) = 0, c(A) = 1$. ゆえに, $d(A) \leq c(A)$.

3. $A = \neg B$ のとき.

帰納法の仮定から, $d(B) \leq c(B)$.

$d(A), c(A)$ の定義より, $d(A) = d(B) + 1, c(A) = c(B) + 1$. よって, $d(A) = d(B) + 1 \leq c(B) + 1 = c(A)$.

24/39

4. $A = B \wedge C$, または, $A = B \vee C, A = B \rightarrow C, A = B \leftrightarrow C$ のとき.

帰納法の仮定から, $d(B) \leq c(B), d(C) \leq c(C)$.

$d(A)$ の定義より, $d(A) = \max\{d(B), d(C)\} + 1$.

$c(A)$ の定義より, $c(A) = c(B) + c(C) + 1$.

2つの場合に分けて示す.

(1) $d(B) \leq d(C)$ のとき.

このとき, $\max\{d(B), d(C)\} = d(C)$.

よって, $d(A) = \max\{d(B), d(C)\} + 1 = d(C) + 1 \leq d(B) + d(C) + 1 \leq c(B) + c(C) + 1 = c(A)$.

(2) $d(B) > d(C)$ のとき.

このとき, $\max\{d(B), d(C)\} = d(B)$.

よって, $d(A) = \max\{d(B), d(C)\} + 1 = d(B) + 1 \leq d(B) + d(C) + 1 \leq c(B) + c(C) + 1 = c(A)$.

よって, いずれの場合も $d(A) \leq c(A)$. \square

25/39

帰納法による証明例 (2)

命題論理式の変換 t を以下のように定義する.

$$t(A) = \begin{cases} \neg A & (A \text{ が命題変数のとき}) \\ \top & (A = \perp \text{ のとき}) \\ \perp & (A = \top \text{ のとき}) \\ \neg t(B) & (A = \neg B \text{ のとき}) \\ t(B) \vee t(C) & (A = B \wedge C \text{ のとき}) \\ t(B) \wedge t(C) & (A = B \vee C \text{ のとき}) \\ \neg(t(C) \rightarrow t(B)) & (A = B \rightarrow C \text{ のとき}) \\ \neg(t(B) \leftrightarrow t(C)) & (A = B \leftrightarrow C \text{ のとき}) \end{cases}$$

演習 8.11. $t(P \wedge Q)$ を求めよ.

(解答)

$$\begin{aligned} t(P \wedge Q) &= t(P) \vee t(Q) \\ &= (\neg P) \vee (\neg Q) \end{aligned}$$

演習 8.12. 任意の命題論理式 A について $t(A) \cong \neg A$ となること証明せよ.

26/39

27/39

証明. 命題論理式 A に関する帰納法により証明を行う.

1. A が命題変数のとき.

$t(A) = \neg A \cong \neg A$ より成立.

2. $A = \perp$ のとき.

$t(A) = \top \cong \neg \perp = \neg A$ より成立.

3. $A = \top$ のとき.

$t(A) = \perp \cong \neg \top = \neg A$ より成立.

4. $A = \neg B$ のとき.

帰納法の仮定から, $t(B) \cong \neg B$.

よって, $t(A) = \neg t(B) \cong \neg \neg B = \neg A$ より成立.

5. $A = B \wedge C$ のとき.

帰納法の仮定から, $t(B) \cong \neg B, t(C) \cong \neg C$.

よって, $t(A) = t(B) \vee t(C) \cong \neg B \vee \neg C \cong \neg(B \wedge C) = \neg A$ より成立.

28/39

6. $A = B \vee C$ のとき.

帰納法の仮定から, $t(B) \cong \neg B, t(C) \cong \neg C$.

よって, $t(A) = t(B) \wedge t(C) \cong \neg B \wedge \neg C \cong \neg(B \vee C) = \neg A$ より成立.

7. $A = B \rightarrow C$ のとき.

帰納法の仮定から, $t(B) \cong \neg B, t(C) \cong \neg C$. よって, $t(A) = \neg(t(C) \rightarrow t(B)) \cong \neg(\neg C \rightarrow \neg B) \cong \neg(\neg \neg C \vee \neg B) \cong \neg(C \vee \neg B) \cong \neg(\neg B \vee C) \cong \neg(B \rightarrow C) = \neg A$ より成立.

8. $A = B \leftrightarrow C$ のとき.

帰納法の仮定から, $t(B) \cong \neg B, t(C) \cong \neg C$. よって, $t(A) = \neg(t(B) \leftrightarrow t(C)) \cong \neg(\neg B \leftrightarrow \neg C) \cong \neg(\neg(\neg B \rightarrow \neg C) \wedge (\neg C \rightarrow \neg B)) \cong \neg(\neg((C \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C))) \cong \neg((B \rightarrow C) \wedge (C \rightarrow B)) \cong \neg(B \leftrightarrow C) = \neg A$ より成立. \square

29/39

帰納法による証明例 (3)

定義 8.13. 命題論理式 A に含まれる命題変数の集合 $V(A)$ は次のように定義される.

$$V(A) = \begin{cases} \{A\} & (A \text{ が命題変数のとき}) \\ \emptyset & (A = \top \text{ または } A = \perp \text{ のとき}) \\ V(B) & (A = \neg B \text{ のとき}) \\ V(B) \cup V(C) & (A = B \wedge C \text{ または } A = B \vee C, \\ & A = B \rightarrow C, A = B \leftrightarrow C \text{ のとき}) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} V(\neg(P \wedge Q)) &= V(P \wedge Q) \\ &= V(P) \cup V(Q) \\ &= \{P\} \end{aligned}$$

演習 8.14. $V(\neg(\neg R) \vee S)$ を計算せよ.

30/39

$$\begin{aligned} V(\neg(\neg R) \vee S) &= V(\neg R) \cup V(S) \\ &= V(R) \cup \{S\} \\ &= \{R\} \cup \{S\} \\ &= \{R, S\} \end{aligned}$$

演習 8.15. $|V(A)| \leq 2^{d(A)}$, つまり, 命題論理式 A に含まれる変数の個数はたかだか $2^{d(A)}$ 個となることを示せ.

31/39

証明. 命題論理式 A に関する帰納法により証明を行う.

1. A が命題変数のとき.

このとき, V の定義より, $V(A) = \{A\}$. よって, $|V(A)| = 1$.

一方, 命題論理式の深さ d の定義より, $d(A) = 0$. よって, $2^{d(A)} = 2^0 = 1$.

ゆえに, $|V(A)| = 1 \leq 1 = 2^{d(A)}$.

2. $A = \top$ または $A = \perp$ のとき.

このとき, V の定義より, $V(A) = \emptyset$. よって, $|V(A)| = 0$.

一方, 命題論理式の深さ d の定義より, $d(A) = 0$. よって, $2^{d(A)} = 2^0 = 1$.

ゆえに, $|V(A)| = 0 \leq 1 = 2^{d(A)}$.

3. $A = \neg B$ のとき.

このとき, V の定義より, $V(A) = V(B)$. よって, $|V(A)| = |V(B)|$.

32/39

一方, 命題論理式の深さ d の定義より, $d(A) = d(B) + 1$.

また, 帰納法の仮定により, $|V(B)| \leq 2^{d(B)}$.

ゆえに, ($d(B) \geq 0$ であることから), $|V(A)| = |V(B)| \leq 2^{d(B)} \leq 2^{d(B)} \cdot 2 = 2^{d(B)+1} = 2^{d(A)}$.

4. $A = B \wedge C$, または, $A = B \vee C$, $A = B \rightarrow C$, $A = B \leftrightarrow C$ のとき.

このとき, V の定義より, $V(A) = V(B) \cup V(C)$. よって, $|V(A)| \leq |V(B)| + |V(C)|$. (集合に重なりがあるときは, $|V(A)| < |V(B)| + |V(C)|$ となることに注意.) 一方, 命題論理式の深さ d の定義より, $d(A) = \max\{d(B), d(C)\} + 1$. また, 帰納法の仮定により, $|V(B)| \leq 2^{d(B)}$, $|V(C)| \leq 2^{d(C)}$. ゆえに, $|V(A)| \leq |V(B)| + |V(C)| \leq 2^{d(B)} + 2^{d(C)} \leq 2^{\max\{d(B), d(C)\}} + 2^{\max\{d(B), d(C)\}} = 2^{\max\{d(B), d(C)\}+1} = 2^{d(A)}$. \square

33/39

帰納法による証明例 (4)

定義 8.16. 命題論理式 A の部分論理式の集合 $\text{Sub}(A)$ を次のように定義する.

$$\text{Sub}(A) = \begin{cases} \{A\} & (A \text{ が命題変数または } \\ & A = \top \text{ または } A = \perp \text{ のとき}) \\ \text{Sub}(B) \cup \{A\} & (A = \neg B \text{ のとき}) \\ \text{Sub}(B) \cup \text{Sub}(C) \cup \{A\} & (A = B \wedge C \text{ または } \\ & A = B \vee C, A = B \rightarrow C, \\ & A = B \leftrightarrow C \text{ のとき}) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{例. } \text{Sub}(\neg(P \wedge Q)) &= \text{Sub}(P \wedge Q) \cup \{\neg(P \wedge Q)\} \\ &= \text{Sub}(P) \cup \text{Sub}(Q) \cup \{P \wedge Q\} \cup \{\neg(P \wedge Q)\} \\ &= \{P\} \cup \{Q\} \cup \{P \wedge Q\} \cup \{\neg(P \wedge Q)\} \\ &= \{P, Q, (P \wedge Q), (\neg(P \wedge Q))\} \end{aligned}$$

34/39

演習 8.17. $\text{Sub}(\neg(\neg R) \vee R)$ を計算せよ.

35/39

$$\begin{aligned}
& \text{Sub}(((\neg R) \vee R)) \\
&= \text{Sub}((\neg R)) \cup \text{Sub}(R) \cup \{((\neg R) \vee R)\} \\
&= \text{Sub}(R) \cup \{(\neg R)\} \cup \{R\} \cup \{((\neg R) \vee R)\} \\
&= \{R\} \cup \{(\neg R)\} \cup \{R\} \cup \{((\neg R) \vee R)\} \\
&= \{R, (\neg R), ((\neg R) \vee R)\}
\end{aligned}$$

演習 8.18. A, B を命題論理式としたとき, $A \in \text{Sub}(B)$ ならば $V(A) \subseteq V(B)$ となることを示せ.

A と B のどちらの命題論理式に関する帰納法を使うと良いのだろうか? この場合, 実は, B に関する帰納法を用いると証明に成功し, A に関する帰納法を用いると証明に失敗する.

36/39

づれかが成立する. $A = B$ のとき, $V(A) \subseteq V(B)$ は明らか. $A \in \text{Sub}(C)$ のとき, 帰納法の仮定より $V(A) \subseteq V(C)$. また, 定義より $V(C) \subseteq V(C) \cup V(D) = V(B)$. よって, $V(A) \subseteq V(B)$. $A \in \text{Sub}(D)$ のとき, $A \in \text{Sub}(C)$ と同様. \square

38/39

証明. 命題論理式 B に関する帰納法により証明を行う.

1. B が命題変数または $B = \top$, $B = \perp$ のとき.

このとき $\text{Sub}(B) = \{B\}$. 従って, $A \in \text{Sub}(B)$ とすると, $A = B$. よって, $V(A) \subseteq V(B)$.

2. $B = \neg C$ のとき.

このとき $\text{Sub}(B) = \text{Sub}(C) \cup \{B\}$. よって, $A \in \text{Sub}(B)$ とすると $A = B$ または $A \in \text{Sub}(C)$. $A = B$ のとき, $V(A) \subseteq V(B)$ は明らか. $A \in \text{Sub}(C)$ のとき, このときは, 帰納法の仮定より $V(A) \subseteq V(C)$. また, 定義より $V(B) = V(C)$. よって $V(A) \subseteq V(B)$ が成立する.

3. $B = C \wedge D$ または $B = C \vee D$, $B = C \rightarrow D$, $B = C \leftrightarrow D$ のとき.

このとき $\text{Sub}(B) = \text{Sub}(C) \cup \text{Sub}(D) \cup \{B\}$. よって, $A \in \text{Sub}(B)$ とすると $A \in \text{Sub}(C)$, $A \in \text{Sub}(D)$, $A = B$ のい

37/39

まとめ

- 帰納的定義
- (構造) 帰納法による証明
 - 帰納的に定義された対象に関する性質を証明
 - 帰納法の仮定とは
- 再帰的な定義
 - それ自身を定義のなかで用いた定義
 - 再帰的に定義された値の計算
 - 定義が **well-defined** であるとは

39/39